

剪除毒類黑德病在外注意事項

一、黑德病之毒類最久為害據中央農業實驗所前查民國

廿四年全國各地毒類因病減產產量小者為 5% 大者即假

若依此推算推算總數年產小麥之 10% 担者不復損失度增

四五五。担大者年產 1000 担不復損失度增 1000 担者

現時市價三元元計年增會去年九月份因黑德病損即連

元九四。元為毒之銀元定為 10 元人呈為我免是理據大特訂

剪除毒類黑德病注意事項如下

一、黑德病之性狀 黑病

一、散黑德病 受病者葉面呈黃褐色或黑褐色較於

本外皆白或赤身腹易破裂或破裂皮於木肌處生得勝土而或

形如豆粒或時時微痛乃中物也

二、**三焦疝病** 病起於任大腹短在命門均係存固有用於外

現身如腫異然而多結皆由寒濕也

而成於塊破其外或結之亦不易破碎

三、**疝疝** 病起於長腹小腹與女能捷捷或重一時下

痛捷則直下而得尾胡方散也

為善赤色物不論之指面感有脂膏臭之有無腫氣故名

四、**疝疝** 病起於小腹或腹前或後刺刺得和叶片上

生灰白色或黃白色條紋初時外及平滑而後收漸次膨脹



外有... 卷... 第... 页... 云云

死

二... 卷... 第... 页... 云云

人身... 卷... 第... 页... 云云

是... 卷... 第... 页... 云云

示... 卷... 第... 页... 云云

不... 卷... 第... 页... 云云

三... 卷... 第... 页... 云云

甲... 卷... 第... 页... 云云

此... 卷... 第... 页... 云云

